



PROTÉGEZ VOTRE CORPS

Portez une combinaison

QUAND LA PORTER

PORTEZ UNE COMBINAISON

Lors de tout risque d'exposition aux produits phytopharmaceutiques :

- 1/ Ouverture produit
- 2/ Application
- 3/ Pesée*
- 4/ Préparation de la bouillie
- 5/ Nettoyage sur le pulvérisateur en cours de traitement*
- 6/ Intervention

PESÉE & PRÉPARATION

Plus de 65 % des expositions interviennent lors de la préparation de la bouillie via le corps. Protégez-le ! À ce stade, une attention particulière est demandée, car le produit phytopharmaceutique est concentré.

APPLICATION

Portez une combinaison si le pulvérisateur est sans cabine, si le traitement est réalisé à l'atomiseur, au pulvérisateur pneumatique ou à l'aide d'une lance. Dans le cas d'un pulvérisateur avec cabine fermée et filtre à charbon actif, il est recommandé d'ôter la combinaison pour rentrer dans la cabine. Elle doit être gardée à proximité pour une intervention sur le pulvérisateur ou sur la culture traitée (idéalement dans une caisse hermétique à l'extérieur de la cabine du tracteur).

LAVEZ UNE COMBINAISON

Lavez immédiatement toute partie de la combinaison souillée par le produit phytopharmaceutique. Lavez-vous les mains gantées ainsi que les avant-bras à la fin de chaque travail (préparation, remplissage, pulvérisation...).

NETTOYAGE

Le nettoyage requiert également une attention particulière. Les projections sont nombreuses. Veillez à ce que la combinaison recouvre les bottes et que vos avant-bras soient bien protégés.

COMMENT LA CHOISIR, LA PORTER



Choisir sa combinaison (Cat.III, type 3/4/5/6 ou de niveau C1/C2/C3 de la norme 27 065) selon **l'exposition de l'opérateur et le classement du produit phytopharmaceutique**. Vérifiez les vêtements avant toute utilisation, afin de détecter toute usure ou déchirure éventuelle. **Lire la notice d'instruction de l'équipement de protection individuelle** et vérifiez la date de péremption, si elle est précisée.



Il est recommandé de porter des vêtements à manches longues sous la combinaison. Enfilez votre combinaison. Chaussez les bottes en veillant à ce que les jambes de la combinaison recouvrent les bottes. Mettez vos protections des yeux et de la face si nécessaire. Remontez la capuche. Enfilez les gants par-dessus la combinaison s'ils sont de plus de 35 cm de long sinon portez-les par-dessous.

COMMENT L'ENLEVER, LA STOCKER OU L'ÉLIMINER



Se déshabiller dans un endroit propre (vestiaire). Rincez à l'eau claire les gants, la combinaison, l'écran facial éventuel et les bottes sur l'aire de lavage.



Prendre une douche après chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ne pas fumer, boire, téléphoner ou manger pendant le traitement. Ne jamais laver les vêtements souillés avec les vêtements familiaux.



Les combinaisons sans souillure et sans altération seront stockées sur un cintre à l'abri de la lumière dans un endroit propre et sec (hors local phytopharmaceutique et à part des vêtements civils et des E.P.I. neufs). Les combinaisons défectueuses ou endommagées seront stockées dans le local phytopharmaceutique puis éliminées par une filière spécialisée. Les combinaisons neuves seront conservées à l'abri de la lumière et dans un endroit propre et sec (hors local phytopharmaceutique).*

**Parce que l'agriculture durable se construit ensemble,
nous plaçons la santé et la sécurité au cœur d'exigences communes.**

Raisonnement l'ergonomie, l'organisation du travail, la protection collective et enfin les équipements de protection individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des E.P.I. revient à l'agriculteur ou à l'employeur de salariés utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le salarié utilisateur est également responsable de la décision du port de ces équipements.



Bayer Service Infos

0 800 25 35 45 Service & appel gratuits

Bayer S.A.S.
Division Crop Science / Crop Protection
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
France
www.bayer-agri.fr